



本PDF文件由


免费提供, 全部信息请点击[29218-27-7](#), 若要查询其它化学品请登录[CAS号查询网](#)如果您觉得本站对您的学习工作有帮助, 请与您的朋友一起分享:) [爱化学www.ichemistry.cn](#)

## CAS Number:29218-27-7 基本信息

中文名: 托洛沙酮;  
涛洛西酮;  
多劳喜动;  
5-羟甲基-3-(3-甲基苯基)噁唑烷-2-酮

英文名: 2-Oxazolidinone, 5-(hydroxymethyl)-3-(3-methylphenyl)-

别名: 2-Oxazolidinone, 5-(hydroxymethyl)-3-m-tolyl- (8CI);  
3-(3-Methylphenyl)-5-hydroxymethyl-2-oxazolidinone;  
69276MD;  
Delalande 69276;  
Humoryl;  
MD 69276;  
Perenum;  
Taloxotone;  
Toloxatone



分子式:  $C_{11}H_{13}NO_3$

分子量: 207.2258

CAS登录号: 29218-27-7

EINECS登录号: 249-522-2

## 物理化学性质

性质描述: **托洛沙酮(29218-27-7)的性状:**  
1. 从**异丙醇**结晶, 熔点76℃。  
2. 急性毒性LD<sub>50</sub>小鼠(mg/kg): 1850或1500口服。  
只需轻轻,

CAS#29218-27-7化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)

供应商信息已更新, 请登录爱化学 [CAS No. 29218-27-7 查看](#)  
若您是此化学品供应商, 请按照[化工产品收录](#)说明进行免费添加

## 其他信息

产品应用: **托洛沙酮(29218-27-7)的用途:**  
该药为可逆性的A型单胺氧化酶抑制剂, 用于抗抑郁。无镇静作用, 无药物积蓄性危险。  
只需轻轻,

**1. 托洛沙酮(29218-27-7)的生产方法:**  
间甲基**苯胺**和3-羟基环氧丙烷在加热下反应, 生成3-间甲基氨基-1, 2-**丙二醇**, 在**甲醇钠**作用下和**氯甲酸甲酯**环合, 得到托洛沙酮(29218-27-7)。

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 生产方法及其他: | <p><b>2. 托洛沙酮(29218-27-7)的作用与用途:</b></p> <p>本品为一具有新型结构的抗抑郁药,其作用机制为选择性地抑制MAO-A活性,从而阻止5-HT和NA的代谢,产生抗抑郁作用。其对MAO-A的选择性抑制作用是可逆的。本品与食物及其它药物无相互作用,可与各种药物配合使用。</p> <p>口服后吸收迅速,经30—60分钟达峰浓度。体内代谢快,最后自尿中排出,以代谢产物为主,原形仅有5%—10%。</p> <p>适用于治疗神经官能性抑郁症、神经质和非神经质性抑郁、退化性抑郁症、躁狂抑郁性精神病人的抑郁症发作。亦可用于精神病的抑郁或痴呆期。</p> <p><b>3. 托洛沙酮(29218-27-7)的用法与用量:</b></p> <p>口服,每次200mg,每日3次,饭时服。</p> <p><b>4. 副作用与毒性:</b></p> <p>(1)偶见消化不良、恶心、呕吐、头痛、头晕等,精神病患者可出现谵妄。</p> <p>(2)禁止与其他MAOI合用。</p> <p>(3)躁狂症与谵妄患者禁用。孕妇慎用。</p> <p><b>5. 制剂:</b></p> <p>胶囊剂:每胶囊0.2g。</p> <p><b>6. 注意事项:</b></p> <p>(1)偶见消化不良、恶心、呕吐、头痛、头晕等,精神病患者可出现谵妄。</p> <p>(2)禁止与其他MAOI合用。</p> <p>(3)与其它抗抑郁药一样,应在停用其他MAOI后隔15~20日才可用本品。</p> <p>(4)躁狂症与谵妄患者禁用。孕妇慎用。</p> <p>(5)本品有脱抑制作用,故对精神分裂症患者使用时,应特别注意监护。</p> <p>(6)应用本品应注意血压的变化。</p> <p>(7)用药期间不应饮用含酒精的饮料。</p> <p>(8)全麻情况下,须停药6个小时以上方可用药。</p> <p>只需轻轻,</p>                      |
|          | 相关化学品信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | <p><a href="#">29213-16-9</a> <a href="#">29193-63-3</a> <a href="#">6-甲氧基苯并噁唑</a> <a href="#">29784-85-8</a> <a href="#">29745-39-9</a> <a href="#">环己烷二胺</a> <a href="#">消旋啡烷</a> <a href="#">29511-22-6</a> <a href="#">29111-46-4</a> <a href="#">2937-24-8</a> <a href="#">2948-67-6</a> <a href="#">29843-60-5</a> <a href="#">29702-25-8</a> <a href="#">29218-20-0</a> <a href="#">29913-90-4</a> <a href="#">29375-30-2</a> <a href="#">29414-46-8</a> <a href="#">29234-88-6</a> <a href="#">29262-58-6</a> <a href="#">29293-34-3</a> <a href="#">29278-59-9</a> <a href="#">2973-43-5</a> <a href="#">29395-32-2</a> <a href="#">五环[5.4.0.0.02,6.03,10.05,9]十一烷-8,11-二酮</a> <a href="#">2-甲基-5-硝基苯并噁唑</a> <a href="#">29758-89-2</a> <a href="#">2902-56-9</a> <a href="#">2902-93-4</a> <a href="#">290371-75-4</a> <a href="#">29068-27-7</a></p> |

生成时间2014-3-22 14:48:46