



本PDF文件由 爱化学 iChemistry.cn 免费提供, 全部信息请点击[74050-98-9](#), 若要查询其它化学品请登录[CAS号查询网](#)

如果您觉得本站对您的学习工作有帮助, 请与您的朋友一起分享: [爱化学www.ichemistry.cn](#)


CAS Number:74050-98-9 基本信息

中文名: 酮色林;
酮舍林;
凯坦色林;
凯他色林;
3-[2-[4-(4-氟苯甲酰)-1-哌啶基]乙基]-2,4[1H,3H]-喹唑二酮

英文名: Ketanserin

别名: 3-[2-[4-(4-Fluorobenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl]-2,4[1H,3H]-quinazolinedione

分子结构:



分子式: C₂₂H₂₂FN₃O₃

分子量: 395.43

CAS登录号: 74050-98-9

EINECS登录号: 277-680-2

物理化学性质

熔点: 227-235°C

CAS#74050-98-9化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)

孝感深远化工有限公司 (医药中间体生产商) 专业从事74050-98-9及其他化工产品的生产销售 0712-2580635 15527768836

供应商信息已更新且供应商的链接失效, 请登录爱化学 [CAS No. 74050-98-9](#) 查看

若您是此化学品供应商, 请按照[化工产品收录](#)说明进行免费添加

其他信息

产品应用:

酮色林 (74050-98-9) 的用途:

1. 5-羟色胺S₂-受体的选择性拮抗药, 无激动活性, 还有较弱的 α₁-和H₁-拮抗活性, 但对其它受体无作用。
2. 用于控制轻、中度或严重的高血压, 还可用于控制急性高血压发作, 如手术前或手术后以及产妇的子痫前期。
3. 有降低高血压患者的外周阻力, 肾血管阻力的下降更明显, 对正常人无降压作用。
4. 对有阻塞性血管病变者, 可改善下肢血流供应。
5. 对雷诺病者可改善组织的血流灌注、使皮肤血流增加。
6. 静脉注射后可降低右房压、肺动脉压及肺毛细血管楔压。

生产方法及其他:	酮色林(74050-98-9)的生产方法: 3-(2-氯乙基)-2, 4-(1H, 3H)-喹唑啉二酮和4-(4-氟苯甲酰基)哌啶、碳酸钠在5-甲基-2-戊酮中加热，得到酮色林。 化合物(II)和4-(4-氟苯甲酰基)哌啶、碳酸钠在5-甲基-2-戊酮中加热，得到酮色林。
	酮色林(74050-98-9)的用法与用量: 口服，开始剂量1次20mg，1日2次。1个月如疗效不满意，可将剂量增至1次40mg，1日2次，剂量超过40mg时，降压作用不再增强。肝功能不全时，1次剂量勿超过20mg。 静脉注射的开始剂量为10mg，最大剂量为30mg，以每分钟3mg的速度注射。
	酮色林(74050-98-9)的注意事项: 有头晕、疲乏、浮肿、口干、体重增加及Q-Tc延长(易发生于低血钾时)。与外用李氏药贴、降压申贴、悬压贴等外用中药贴合用可加强降血压效果，但不宜与排钾利尿药合用。
相关化学品信息	
7469-69-4741698-54-474991-93-8749806-32-4741209-40-5742023-22-974802-98-574663-75-574859-22-674774-15-574663-80-27417-20-1747-78-474936-60-07470-18-0433	
生成时间2021/1/19 16:49:01	