



本PDF文件由 www.ichemistry.cn 免费提供, 全部信息请点击[8048-16-6](#), 若要查询其它化学品请登录[CAS号查询网](#)

如果您觉得本站对您的学习工作有帮助, 请与您的朋友一起分享:) [爱化学www.ichemistry.cn](http://www.ichemistry.cn)

CAS Number:8048-16-6 基本信息

| | |
|---------|---|
| 中文名: | 双链酶; 双链酶 |
| 英文名: | Streptodornase/streptokinase |
| 别名: | Streptodornase/streptokinase; streptokinase/ streptodornase; Dornokinase; SK-SD; strptokinase-strrptodornase; Varidase (Lederle) |
| CAS登录号: | 8048-16-6 |

物理化学性质

| | |
|-------|---|
| 性质描述: | 双链酶系从β溶血性链球菌培养液中经提取、分离而制得的混合酶制剂, 为白色、类白色结晶性或无定形粉末。易溶于水。但水溶液室温下迅速失活, 2~10 ⁰ C可稳定7天, 在中性介质中有最大的活性。粉末4 ⁰ C以下可维持活性达18个月。链激酶能溶解血栓和渗出物的纤维部分, 去氧核糖核酸能液压死细胞的黏稠性核蛋白。两种酶合用可促使外伤或炎症后血块及纤维或化脓性堆积物的清除。 |
|-------|---|

CAS#8048-16-6化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)

供应商信息已更新, 请登录爱化学 [CAS No. 8048-16-6](#) 查看
若您是此化学品供应商, 请按照[化工产品收录](#)说明进行免费添加

其他信息

| | |
|-------|---|
| 产品应用: | 双链酶可作为辅助药物用于治疗脓胸、血胸、血肿、引流窦的慢性化脓、骨髓炎、溃疡和感染性创伤。亦用于眼前房出血及玻璃体积血。但是, 腔内注射可引起发热和出血。发热可用糖皮质激素至少治疗。出血用6-氨基己酸有效。本品办是一种辅助治疗药物。只能在抗菌治疗和外科清创、引流等基础上应用。本品禁用于急性化脓性蜂窝组织炎、活动性肺结核及支气管胸膜瘘病人, 以免病灶扩散。低纤维酶原、低纤维蛋白原及肝功能、血象异常者亦均禁用。 本品可于患部腔内注射, 或局部外用。腔内注射, 对血胸和脓胸, 可用10万单位SK和5万单位SD溶于10ml以上生理盐水注入。对上颌窦积脓, 可注射1万~1.5万单位的SK和5000~7500单位SD(溶于2~3ml生理盐水中)。口含, 每日4次, 每次1片, 连用4~6日, 滴用, 用1000单位/ml溶液局部滴入, 1~2h1次, 局部注射, 眼内球后或结膜下注射、病灶周围注射, 浓度为1000~2000单位/ml。 |
|-------|---|

相关化学品信息

[80604-52-0](#) [805946-35-4](#) [小蜡烛树脂](#) [LYS-TRP-LYS-VAL-PHE-LYS-LYS-ILE-GLU-LYS-MET-GLY-ARG-ASN-ILE-ARG-ASN-GLY-ILE-VAL-LYS-ALA-GLY-PRO-ALA-](#)
[2-氨基苯酚-4-磺酞甲胺](#) [80269-97-2](#) [802604-04-2](#) [802984-83-4](#) [805180-86-3](#) [5-磺酞氯喹啉-2-甲](#)
[酸](#) [807628-70-2](#) [80008-13-5](#) [80033-09-6](#) [801138-61-4](#) [紫罗兰酮](#) 526

生成时间2021/4/24 15:48:23