



本PDF文件由

免费提供, 全部信息请点击[89943-82-8](#), 若要查询其它化学品请登录[CAS号查询网](#)如果您觉得本站对您的学习工作有帮助, 请与您的朋友一起分享:) [爱化学www.ichemistry.cn](#)


CAS Number:89943-82-8 基本信息

中文名: 西氯他宁;
西氯他宁

英文名: Furo[3,4-c]pyridin-7-ol, 3-(4-chlorophenyl)-1,3-dihydro-6-methyl-

别名: Furo[3,4-c]pyridin-7-ol, 3-(4-chlorophenyl)-1,3-dihydro-6-methyl-, (?à)-;
(?à)-Cicletanine;
Cicletanide;
Cicletanine;
Cycletanide;
Win 90000

分子结构:

分子式: C₁₄H₁₂ClNO₂

分子量: 261.70

CAS登录号: 89943-82-8

CAS#89943-82-8化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)

供应商信息已更新, 请登录爱化学 [CAS No. 89943-82-8](#) 查看若您是此化学品供应商, 请按照[化工产品收录](#)说明进行免费添加

其他信息

产品应用:

西氯他宁(89943-82-8)的用途:

作用开始迅速, 可持续6~10小时。服用100mg的利尿作用与苄氟噻嗪5mg者相当。

生产方法及其他:

1. 用法用量:

用于高血压, 中、轻度者日服50mg即可生效, 对重度者需日服200mg。

2. 药物说明:

片剂: 50mg。

3. 西氯他宁(89943-82-8)的注意事项:

同[氢氯噻嗪](#)。

1. 长期服用, 易发生电解质平衡紊乱, 如低钠血症、低氯血症、低钾血症性碱血症。2. 潴留现象 如高尿酸血症、高钙血症, 主要是药物减少细胞外液容量, 增加近曲小管对尿酸的再吸收所致, 痛风者慎用。

3. 代谢性变化 与剂量有关, 可致高血糖、高脂血症。致肾素、醛固酮的过度分泌。对血脂可使血清甘油三酯及低密度脂蛋白-胆固醇(LDL-cho)量增加, 同时伴有高密度脂蛋白(HDL)的减少, 有报道同时应用β受体阻断药可防止利尿药引起的LDL-cho的升高。还可降低糖耐量, 使血糖升高, 可能是抑制了胰岛素的分泌或抑制肝PDE, 因此使cAMP中介的糖原分解作用加强, 糖尿病患者慎用。

4. 高敏反应 如发热、皮疹、过敏反应。

	5. 其他 可增高血尿素氮，加重肾功能不良。无尿及对磺胺过敏者禁用本类药物。 6. 不可突然停药，应逐渐减量。 7. 在治疗肝硬化而引起的腹水时，最好与螺内酯合用，以防止发生肝昏迷。 8. 肝肾功能不全者、痛风、糖尿病患者慎用。							
相关化学品信息								
898790-84-6	898769-43-2	898786-41-9	89941-77-5	898757-10-3	898763-29-6	898749-04-7	898763-99-0	898751-
46-7	898780-47-7	89303-92-4	898767-30-1	4-氯-2-硝基苯胺	89417-35-6	898789-17-8	454	
生成时间2021/6/17 7:29:23								